

# Calcitran® B12

fosfato de cálcio tribásico + glicerofosfato de cálcio + cianocobalamina (vitamina B12) + ergocalciferol (vitamina D2)+ fluoreto de sódio

Suplemento de cálcio + associação

## APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo frasco com 150mL, acompanhado de copo-medida.

Forma farmacêutica: suspensão oral.

## USO ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 4 ANOS

## COMPOSIÇÃO:

Cada mL da suspensão oral contém:

Fosfato de cálcio tribásico (equivalente a 5,98mg de cálcio) .....	15 mg
Glicerofosfato de cálcio (equivalente a 3,05mg de cálcio) .....	16 mg
Cianocobalamina (vitamina B12) .....	0,001 mg
Ergocalciferol (vitamina D2) .....	0,025 mg
Fluoreto de sódio (equivalente a 0,023 mg de flúor) .....	0,05 mg
Veículo* q.s.p. ....	1 mL

\*ácido cítrico, pectina cítrica, sorbitol, propilenoglicol, álcool etílico, metilparabeno, propilparabeno, sacarose, aroma de cereja, corante vermelho eritrosina, simeticona e água purificada.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Calcitran® B12 é indicado como suplemento mineral e vitamínico na prevenção e tratamento auxiliar nos casos de osteoporose (desmineralização óssea pré e pós-menopausa); anemias carenciais; dietas restritivas e inadequadas; doenças crônicas e convalescença; e raquitismo (distúrbio envolvendo o enfraquecimento dos ossos).

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Calcitran® B12 funciona como suplemento mineral e vitamínico. Cada um dos ingredientes ativos de sua fórmula tem por objetivo suprir as deficiências de nutrientes originadas da dieta ou de condições fisiológicas específicas.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Calcitran® B12 não deve ser utilizado por pacientes com alergia a qualquer um dos componentes da formulação. O uso deste medicamento também é contraindicado em indivíduos portadores de cálculos renais (pedras nos rins), hipercalcemia (nível elevado de cálcio no sangue) e hipercalcúria (nível elevado de cálcio na urina) primária e secundária.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Atenção, diabéticos: contém açúcar.**

**Contém 0,5% de álcool.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

#### Precauções e advertências

Para pacientes predispostos à formulação de cálculos no trato urinário, recomenda-se um aumento na ingestão de líquidos e, nestes casos, a dosagem a ser utilizada deverá ser estabelecida pelo médico.

Deve-se ter cautela na administração de Calcitran® B12 quando existirem os seguintes problemas: desidratação, diarreia, insuficiência renal crônica e má absorção intestinal crônica.

Não existem advertências ou restrições do uso do produto para pacientes idosos.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Atenção, diabéticos: contém açúcar.**

**Contém 0,5% de álcool.**

#### Interações medicamentosas

Pode reduzir a resposta aos bloqueadores dos canais de cálcio (como por exemplo, os medicamentos contendo os seguintes fármacos: nifedipina, nitrendipina e diltiazem).

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### REFERÊNCIA DE COR

■ Preto

CÓDIGO ANTIGO	500005431
CÓDIGO NOVO	500006395/21-00

## 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Calcitran® B12 é apresentado em forma de suspensão oral, sendo um líquido rosado com sabor agradável e odor característico de cereja.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

### USO ORAL

Crianças: 5mL (meio copo-medida), duas vezes por dia, antes das refeições.

Adultos: 10mL (um copo-medida), duas ou três vezes por dia, antes das refeições.

Este modo de usar poderá ser modificado, conforme orientação médica.

Agite bem o produto antes de usá-lo.

Utilizar apenas a via oral. O uso deste medicamento por outra via, que não a oral, pode causar a perda do efeito esperado ou mesmo provocar danos à saúde.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma ou mais doses deste medicamento, a posologia indicada deverá ser retomada, não havendo necessidade de repor as doses esquecidas.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A ocorrência de reações adversas com o uso de Calcitran® B12 é rara. Eventualmente, podem ocorrer: náuseas, anorexia (sensação diminuída de apetite), constipação intestinal (dificuldade constante ou eventual de evacuação), dor abdominal, secura da boca, sede e poliúria (aumento do volume urinário), que desaparecerão com a simples interrupção do tratamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTA MEDICAMENTO?

Recomenda-se procurar auxílio médico. Na ausência da experiência com superdosagem aguda, é razoável assumir que os procedimentos de lavagem gástrica e tratamento geral de suporte devem ser empregados.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

MS: 1.5620.0002.001-7

Farmacêutica Responsável: Dra. Líbia Bentes Machado  
CRF-PE nº 2991

Fabricado por: LABORATÓRIO TAYUYNALTD.A.  
Av. Ampélio Gazzetta, 889 - Parque Industrial Fritz Berzin  
Nova Odessa - SP - CNPJ: 60.879.848/0001-64  
Indústria brasileira

Registrado e distribuído por:

**VIDFARMA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**  
Rodovia BR - 232, km 63, s/n Parque Industrial - Pombos - PE  
CNPJ: 03.993.167/0001-99 - Indústria brasileira

0800 025 0110  
sac@tqm.com.br

500006395/21-00  
BU AB 200x200mm  
AR011020



Siga corretamente o modo de usar,  
não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

## REFERÊNCIA DE COR

■ Preto

CÓDIGO ANTIGO	500005431
CÓDIGO NOVO	500006395/21-00